

Upitnik o boli s licima – revidiran (FPS-R)

U sljedećim uputama recite "boli" ili "bol", koje god se čini prikladnim za intervjuirano dijete.

"Ova lica pokazuju koliko nešto može boljeti. Ovo lice [pokažite krajnje lijevo lice] pokazuje da nema boli. Lica pokazuju da sve jače boli [pokažite svako lice s lijeva na desno] sve do ovog [pokažite krajnje desno lice] - ono pokazuje vrlo jaku bol. Pokaži lice koje pokazuje koliko te boljelo [koliko te boli sada]."

Bodujte odabrano lice sa **0, 2, 4, 6, 8, ili 10**, brojeći s lijeva na desno, tako da "0" = "nema boli" i "10" = "vrlo jaka bol". Ne upotrebljavajte riječi poput "sretan" ili "tužan". Ovaj upitnik namijenjen je procjeni kako se djeca osjećaju iznutra, a ne kako im lica izgledaju.

Odobrenje za uporabu. Nositelj autorskog prava upitnika FPS-R je International Association for the Study of Pain (IASP) © 2001. Dopušteno je umnožavanje ovog materijala za **nekomercijalnu kliničku, obrazovnu i istraživačku** uporabu. Za reproduciranje upitnika FPS-R u časopisu, knjizi ili na web-stranici, ili za bilo koju komercijalnu uporabu upitnika, potrebno je zatražiti odobrenje IASP-a Internetom na adresi www.iasp-pain.org/FPS-R.

Izvori. Hicks CL, von Baeyer CL, Spafford P, van Korlaar I, Goodenough B. The Faces Pain Scale – Revised: Toward a common metric in pediatric pain measurement. Pain 2001;93:173-183. Bieri D, Reeve R, Champion GD, Addicoat L, Ziegler J. The Faces Pain Scale for the self-assessment of the severity of pain experienced by children: Development, initial validation and preliminary investigation for ratio scale properties. Pain 1990;41:139-150.

(presavijte po isprekidanoj liniji)

10

8

6

4

2

0

