

## Skala Kesakitan Muka – Disemak Semula (FPS-R)

Dalam arahan-arahan berikut, gunakan perkataan "sakit".

"Muka-muka ini menunjukkan bagaimana sesuatu itu boleh menyakitkan. Muka ini [tunjukkan pada muka yang paling kiri] menunjukkan tiada kesakitan. Muka-muka ini menunjukkan kesakitan yang makin lama makin banyak [tunjukkan pada setiap muka dari kiri ke kanan] sehingga ke muka ini [tunjukkan muka paling kanan] - ia menunjukkan kesakitan yang amat sangat. Tunjukkan pada muka yang menunjukkan betapa banyak kesakitan yang sedang anda alami [sekarang]."

Berikan skor pada muka yang dipilih **0, 2, 4, 6, 8, atau 10**, kira dari kiri ke kanan, jadi "0" = "tiada kesakitan" dan "10" = "kesakitan yang amat sangat". Jangan gunakan perkataan seperti "gembira" dan "sedih". Skala ini digunakan untuk mengukur bagaimana kanak-kanak merasa di dalam, bukan bagaimana wajah mereka kelihatan.

**Keizinan untuk Digunakan.** Hakcipta bagi FPS-R adalah dipegang oleh International Association for the Study of Pain (IASP) ©2001. Bahan ini boleh dibuat salinan foto untuk kegunaan **klinikal bukan komersil, pendidikan, dan kajian**. Bagi cetakan semula FPS-R dalam jurnal, buku, atau laman web, atau untuk sebarang penggunaan komersil skala ini, keizinan harus diperolehi daripada IASP atas talian di [www.iasp-pain.org/FPS-R](http://www.iasp-pain.org/FPS-R).

**Sumber-sumber.** Hicks CL, von Baeyer CL, Spafford P, van Korlaar I, Goodenough B. The Faces Pain Scale – Revised: Toward a common metric in pediatric pain measurement. Pain 2001;93:173-183. Bieri D, Reeve R, Champion GD, Addicoat L, Ziegler J. The Faces Pain Scale for the self-assessment of the severity of pain experienced by children: Development, initial validation and preliminary investigation for ratio scale properties. Pain 1990;41:139-150.

(lipat mengikut titik garisan)

10

8

6

4

2

0

